



DANVILLE MATERIALS – USA INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparaty do znoszenia nadwrażliwości pozabiegowej, po oszlifowaniu zębów oraz obnażonych szyjek.



MICROPRIME G

- skutecznie eliminuje nadwrażliwość pozabiegową i nadwrażliwość spowodowaną obnażeniem szyjek.
- kompatybilny z systemami wiążącymi, w których używa się wytrawiacza (total etch).
- można używać także z systemami samotrawiącymi, cementami i amalgamatem.
- doskonale do zabezpieczania zębów po oszlifowaniu pod korony.

Doskonale sprawdzają się także do ochrony przed nadwrażliwością i jako preparat antybakteryjny przy osadzaniu uzupełnień tymczasowych, wypełnień amalgamatowych i przy obnażonych szyjkach. Microprime G jest odpowiednikiem (ma podobny skład) preparatu Gluma Desensitizer - jednak jest o wiele tańszy.

Zawiera 35% HEMA i 5% glutardehydu.

Szczególnie polecany jako preparat antybakteryjny przed użyciem samotrawiących systemów wiążących.

INSTRUKCJA UŻYCIA MICROPRIME:

1. W technice total etch: po wypłukaniu wytrawiacza i wydmuchaniu nadmiaru wody z ubytku, zaaplikować MicroPrime i pozwolić aby preparat pozostał w ubytku ok. 10-20 sekund. Rozdmuchać i nałożyć system wiążący.

2. W sytuacjach, w których nie używa się systemu wiążącego lub samotrawiącego systemu wiążącego: zaaplikować MicroPrime na opracowaną lub oczyszczoną zębinę i pozwolić aby preparat pozostał na niej przez ok. 10-20 sekund. Rozdmuchać i założyć kompozyt lub amalgamat. W przypadku odsłoniętych powierzchni korzeni rezultat może być czasowy

Przechowywanie:

W czasie regularnego używania przechowywać poniżej temperatury 30 st.C i nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Przechowywanie w lodówce może przedłużyć trwałość preparatu. Nie zamrażać.

wersja tłumaczenia: 2013 08 30 P.A.

PRODUCENT:



DANVILLE MATERIALS 3420 Fostoria Way Suite A-200, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, USA

IMPORTER I DYSTRYBUTOR:



ANDERSZ dental boutique
ul. Jana Kazimierza 1/U2, 71-620 Szczecin

www.andersz.com
biuro@andersz.com
tel. 502 652 932, 91 42 19 997

	<p style="text-align: center;">DANVILLE MATERIALS – USA</p> <p style="text-align: center;">INSTRUKCJA UŻYCIA</p> <p style="text-align: center;">Preparaty do znoszenia nadwrażliwości pozabiegowej, po oszlifowaniu zębów oraz obnażonych szyjek.</p> <p style="text-align: center;">MICROPRIME G</p>	

- skutecznie eliminuje nadwrażliwość pozabiegową i nadwrażliwość spowodowaną obnażeniem szyjek.
- kompatybilny z systemami wiążącymi, w których używa się wytrawiacza (total etch).
- można używać także z systemami samotrawiącymi, cementami i amalgamatem.
- doskonale do zabezpieczania zębów po oszlifowaniu pod korony.

Doskonale sprawdzają się także do ochrony przed nadwrażliwością i jako preparat antybakteryjny przy osadzaniu uzupełnień tymczasowych, wypełnień amalgamatowych i przy obnażonych szyjkach. Microprime G jest odpowiednikiem (ma podobny skład) preparatu Gluma Desensitizer - jednak jest o wiele tańszy.

Zawiera 35% HEMA i 5% glutardehydu.

Szczególnie polecany jako preparat antybakteryjny przed użyciem samotrawiących systemów wiążących.

INSTRUKCJA UŻYCIA MICROPRIME:

1. W technice total etch: po wypłukaniu wytrawiacza i wydmuchaniu nadmiaru wody z ubytku, zaaplikować MicroPrime i pozwolić aby preparat pozostał w ubytku ok. 10-20 sekund. Rozdmuchać i nałożyć system wiążący.
2. W sytuacjach, w których nie używa się systemu wiążącego lub samotrawiącego systemu wiążącego: zaaplikować MicroPrime na opracowaną lub oczyszczoną zębinę i pozwolić aby preparat pozostał na niej przez ok. 10-20 sekund. Rozdmuchać i założyć kompozyt lub amalgamat. W przypadku odsłoniętych powierzchni korzeni rezultat może być czasowy

Przechowywanie:

W czasie regularnego używania przechowywać poniżej temperatury 30 st.C i nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Przechowywanie w lodówce może przedłużyć trwałość preparatu. Nie zamrażać.

wersja tłumaczenia: 2013 08 30 P.A.

PRODUCENT:

DANVILLE MATERIALS 3420 Fostoria Way Suite A-200, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, USA

IMPORTER I DYSTRYBUTOR:



ANDERSZ dental boutique
ul. Jana Kazimierza 1/U2, 71-620 Szczecin

www.andersz.com
biuro@andersz.com
tel. 502 652 932, 91 42 19 997



DANVILLE MATERIALS – USA

INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparaty do znoszenia nadwrażliwości pozabiegowej, po oszlifowaniu zębów oraz obnażonych szyjek.



MICROPRIME G

- skutecznie eliminuje nadwrażliwość pozabiegową i nadwrażliwość spowodowaną obnażeniem szyjek.
- kompatybilny z systemami wiążącymi, w których używa się wytrawiacza (total etch).
- można używać także z systemami samotrawiącymi, cementami i amalgamatem.
- doskonale do zabezpieczania zębów po oszlifowaniu pod korony.

Doskonale sprawdzają się także do ochrony przed nadwrażliwością i jako preparat antybakteryjny przy osadzaniu uzupełnień tymczasowych, wypełnień amalgamatowych i przy obnażonych szyjkach. Microprime G jest odpowiednikiem (ma podobny skład) preparatu Gluma Desensitizer - jednak jest o wiele tańszy.

Zawiera 35% HEMA i 5% glutardehydu.

Szczególnie polecany jako preparat antybakteryjny przed użyciem samotrawiących systemów wiążących.

INSTRUKCJA UŻYCIA MICROPRIME:

1. W technice total etch: po wypłukaniu wytrawiacza i wydmuchaniu nadmiaru wody z ubytku, zaaplikować MicroPrime i pozwolić aby preparat pozostał w ubytku ok. 10-20 sekund. Rozdmuchać i nałożyć system wiążący.
2. W sytuacjach, w których nie używa się systemu wiążącego lub samotrawiącego systemu wiążącego: zaaplikować MicroPrime na opracowaną lub oczyszczoną zębinę i pozwolić aby preparat pozostał na niej przez ok. 10-20 sekund. Rozdmuchać i założyć kompozyt lub amalgamat. W przypadku odsłoniętych powierzchni korzeni rezultat może być czasowy

Przechowywanie:

W czasie regularnego używania przechowywać poniżej temperatury 30 st.C i nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Przechowywanie w lodówce może przedłużyć trwałość preparatu. Nie zamrażać.

wersja tłumaczenia: 2013 08 30 P.A.

PRODUCENT:

DANVILLE MATERIALS 3420 Fostoria Way Suite A-200, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, USA

IMPORTER I DYSTRYBUTOR:



DANVILLE MATERIALS – USA INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparaty do znoszenia nadwrażliwości pozabiegowej, po oszlifowaniu zębów oraz obnażonych szyjek.



MICROPRIME G

- skutecznie eliminuje nadwrażliwość pozabiegową i nadwrażliwość spowodowaną obnażeniem szyjek.
- kompatybilny z systemami wiążącymi, w których używa się wytrawiacza (total etch).
- można używać także z systemami samotrawiącymi, cementami i amalgamatem.
- doskonale do zabezpieczania zębów po oszlifowaniu pod korony.

Doskonale sprawdzają się także do ochrony przed nadwrażliwością i jako preparat antybakteryjny przy osadzaniu uzupełnień tymczasowych, wypełnień amalgamatowych i przy obnażonych szyjkach. Microprime G jest odpowiednikiem (ma podobny skład) preparatu Gluma Desensitizer - jednak jest o wiele tańszy.

Zawiera 35% HEMA i 5% glutardehydu.

Szczególnie polecany jako preparat antybakteryjny przed użyciem samotrawiących systemów wiążących.

INSTRUKCJA UŻYCIA MICROPRIME:

1. W technice total etch: po wypłukaniu wytrawiacza i wydmuchaniu nadmiaru wody z ubytku, zaaplikować MicroPrime i pozwolić aby preparat pozostał w ubytku ok. 10-20 sekund. Rozdmuchać i nałożyć system wiążący.
2. W sytuacjach, w których nie używa się systemu wiążącego lub samotrawiącego systemu wiążącego: zaaplikować MicroPrime na opracowaną lub oczyszczoną zębinę i pozwolić aby preparat pozostał na niej przez ok. 10-20 sekund. Rozdmuchać i założyć kompozyt lub amalgamat. W przypadku odsłoniętych powierzchni korzeni rezultat może być czasowy

Przechowywanie:

W czasie regularnego używania przechowywać poniżej temperatury 30 st.C i nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Przechowywanie w lodówce może przedłużyć trwałość preparatu. Nie zamrażać.

wersja tłumaczenia: 2013 08 30 P.A.

PRODUCENT:

DANVILLE MATERIALS 3420 Fostoria Way Suite A-200, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, USA

IMPORTER I DYSTRYBUTOR:



ANDERSZ dental boutique
ul. Jana Kazimierza 1/U2, 71-620 Szczecin

www.andersz.com
biuro@andersz.com
tel. 502 652 932, 91 42 19 997